

Dr. Ludwig Rump

DELEGADO CIENTÍFICO DE LA
I. G. FARBENINDUSTRIE
AKTIENGESELLSCHAFT
SECCIÓN PRODUCTOS PARASITICIDAS
LEVERKUSEN (ALEMANIA)

CONSULTOR TÉCNICO
DE LA
S. A. DE ABONOS MEDEM, MADRID



MADRID ,den 6. Juni 1930
VALENZUELA, 10
APARTADO 995

Herrn
F a u s t
Barcelona, Apartado 407

S/ref.

N/ref.

Nach Mitteilung von Herrn Dr. Krebs, Barcelona, interessieren Sie sich fuer die Bekaempfung der Wollaus an Wurzeln. Da ich annehme, dass es sich um die Wollaus an Baeumen, besonders an Apfel- und Pflaumenbaeumen handelt. teile ich Ihnen ergebenst mit, dass Sie die Behandlung ohne Gefahr mit 5 - 7%iger Aphidonloesung durchfuehren lassen koennen. Meiner Ansicht nach ist jedoch das vollstaendige Eintauchen der Wurzeln in Aphidonloesung nicht erforderlich, da sich die Laeuse nur am Wurzelhals vorfinden werden. In diesem Falle genuegt Bepinseln des freigelegten Wurzelhalses mit einer Aphidonloesung. Zur Erzielung eines sicheren Resultats duerfte es sich dann empfehlen, die Aphidonloesung etwa staerker, etwa 10%ig zu nehmen. Nach der Behandlung wird der Wurzelhals wieder mit Erde bedeckt ohne das Praeparat abzuspuelen. Bei voller Behandlung der Wurzeln durch Eintauchen in 5-7%ige Aphidonloesung wuerde ich Ihnen allerdings Abspuelen des Aphidon nach etwa $\frac{1}{2}$ Std. empfehlen.

Was weiter die Bekaempfung der Ameisen anbetrifft, so koennen Sie, wie Herr Dr. Krebs Ihnen bereits sagte, Zeliopaste mit Honig oder Marmelade gemischt anwenden und diesen Koeder in der Naehel der Ameisennester auslegen. Zu diesem Zweck werden 30 gr Zeliopaste mit ca 200 gr Honig oder Fruchtarmelade innig gemischt. Ferner koennten Sie in die Erdnester der Ameisen 5%ige Aphidonloesung giessen. Die getroffenen Ameisen gehen augenblicklich ein.

Die Obstbaeume selbst schuetzen Sie gegen Ameisen am besten durch Anlegen eines Fangquertels, wozu ich Ihnen unser ARBOCOL empfehlen kann. Dieser Leim haelt sich etwa 6 - 8 Monate frisch. Der Leimring muss in einer Breite von 5 - 8 ctm rings um den Baumstamm gelegt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Baumkrone

Dr.L.Rump

SOCIEDAD ANONIMA DE ABONOS MEDEM

MADRID

Sección Productos Parasitidas

nicht mit anderen, ungeschuetzten Baeumen oder Pflanzen in Kontakt steht, da die Ameisen sonst auf diesem Wege in die Baumkrone gelangen koennten. Zweckmaessigerweise wird nach dem Anlegen des Leimrings der Baum mit 5%iger Aphidonloesung bespritzt, um alle Ameisen, die sich in der Baumkrone befinden, abzutoeten.

Ich hoffe Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und zeichne

hochachtungsvoll

